

Transformando el manejo perioperatorio:

7 días de tratamiento del dolor y la inflamación ¹



- ▶ **Una sola dosis** al menos 24 horas antes de la cirugía y 7 días de control ¹
- ▶ **Efecto dual** - modulando la cascada de la inflamación y el control del dolor para una recuperación más suave ^{1,2}
- ▶ **Control continuo del dolor y la inflamación perioperatoria** ¹
- ▶ **Daxocox®** eficacia clínica demostrada frente a tratamientos de administración diaria ^{5,6}



Vídeo Daxocox®



Ficha técnica

DAXOCOx
(Enflicoxib)



QUE NADA TE DETIENGA

Transformando el manejo perioperatorio

7 días de tratamiento del dolor y la inflamación ¹

1. Preoperatorio

- Evaluar la idoneidad del paciente para terapia con AINE.
- Prescribir/administrar con la comida **1 dosis única (8 mg/kg) por lo menos 24 h antes de la cirugía** ¹.

2. Día de la cirugía

- Confirmar que Daxocox® se administró según lo previsto.
- Proceder con **la anestesia estándar y los protocolos quirúrgicos.**

3. Posoperatorio

- Monitorizar el dolor y la inflamación.
- No es necesaria una dosis adicional de AINE ¹.

Manejo del dolor perioperatorio eficiente y simplificado con alto nivel de cumplimiento por parte del tutor ^{5,6}.

Referencias:
¹ Daxocox SPC. ² Monteiro, B.P. et al. 2022.WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain: *J Small Anim Pract.* 2022; 63(8): 449-476. ³ Mwangi, W.E. et al. (2018). A systematic review of analgesia practices in dogs undergoing ovariectomy. *Vet World.* 11(12): 1725-1735. doi: 10.14202/vetworld.2018.1725-1735. ⁴ Ecuphar Animalcare group. 2024 Internal Market Research Data. ⁵ DA/237/C 2024. Final Study Report – Efficacy and safety of E-6087 for control of postoperative pain and inflammation in dogs undergoing orthopaedic surgery. ⁶ DA/236/C 2024. Final Study Report – Efficacy and safety of E-6087 for control of postoperative pain and inflammation in dogs undergoing soft tissue surgery.

El desafío: control del dolor perioperatorio

Analgesia preventiva

- ▶ Tratar el dolor **antes** de que aparezca el estímulo quirúrgico ²
- ▶ Su objetivo es bloquear las vías del dolor **antes** de que se activen, **reduciendo** la intensidad y la duración del dolor **posoperatorio** y ofreciendo una recuperación más suave ²
- ▶ Es **más eficaz** cuando se administra antes de la aparición del dolor, ya que puede prevenir la sensibilización central y el desarrollo del dolor crónico ²
- ▶ Las **mejores prácticas** recomiendan administrar **analgésicos antes de la inducción** de la anestesia ²

WSAVA

2022
Directrices
para el reconocimiento,
evaluación y tratamiento
del dolor

Todos los perros sufren dolor perioperatorio, el **60%** experimenta dolor moderado a intenso después de la cirugía ³





55% de los veterinarios eligen administrar el AINE **después de la cirugía**, mientras que el **45%** prefieren hacerlo durante **la inducción** ⁴

Daxocox®: Transformando la atención perioperatoria

- ▶ **Analgesia preventiva:** en línea con las directrices actuales de WSAVA ²
- ▶ **Efecto dual:** modula la cascada de inflamación y controla el dolor durante el periodo perioperatorio ¹
- ▶ **Una única dosis:** mejora la comodidad y el cumplimiento por parte del tutor ¹

Daxocox®, datos clínicos frente a opciones de tratamiento diario:



PREOPERATORIO

CIRUGÍA

POSOPERATORIO

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

🕒 1 sola dosis oral con la comida ¹
Al menos 24 horas antes de la cirugía

∞ Efecto dual:
Analgésico + Antiinflamatorio ¹

📅 7 días de tratamiento del dolor y la inflamación ¹

DAXOCOX
(Enflicoxib)

Ecuphar
An Animalcare Company