



PÉRDIDA DE PESO EN GATOS:

Una condición común



Casi **1 de cada 5 gatos** atendidos en consultas veterinarias sufren pérdida de peso.¹



Identificar la causa subyacente **es clave para determinar si la pérdida de peso está relacionada con una enfermedad crónica.**



¿Sabías?

La evaluación nutricional es uno de los 5 signos vitales que se deben valorar durante cualquier examen clínico según la WSAVA⁸ (junto con la temperatura, el pulso, la respiración y el dolor). **Se debe controlar el peso en cada visita.**

Un indicador temprano de enfermedad crónica

- La **pérdida de peso** a menudo se asocia con enfermedades crónicas^{2,3} y **puede ocurrir mucho antes del diagnóstico**. En casos de neoplasias, enfermedad renal crónica e hipertiroidismo puede observarse más de **2 años antes del diagnóstico**⁵.
- Un estudio en gatos con cáncer mostró **pérdida de masa muscular en el 91%** de los gatos afectados⁹. Además, se observó una **reducción de la supervivencia del 80%** (de 17 a 3 meses).¹⁰
- Los gatos pierden un promedio del **8,9% de su peso corporal** en los **12 meses previos al diagnóstico de ERC**⁴.

➔ El control regular del peso es esencial


Requiere una gestión específica

- La **pérdida de peso se acelera** a medida que progresan las enfermedades crónicas^{4,5}.
- **Puede continuar** a pesar del tratamiento nutricional y médico de la enfermedad subyacente^{3,4,5}.


Consecuencias perjudiciales si no se aborda la pérdida de peso

- Deficiencia inmunitaria, retraso en la curación de heridas, disminución de la función muscular.^{2,4}
- **Reducción del tiempo de supervivencia** en muchas enfermedades crónicas^{2,4}, por ejemplo, en la ERC:

Tendencia del peso en gatos antes y después del diagnóstico de ERC⁴



Impacto del peso corporal en la supervivencia en gatos con ERC⁴



Los gatos que pesaban menos de 4,2 kg en el momento del diagnóstico de ERC tuvieron una supervivencia más corta que aquellos que pesaban más de 4,2 kg.

➔ Es fundamental incluir la pérdida de peso en el plan de manejo de la enfermedad crónica y tratarlo específicamente




✓ La detección temprana y el tratamiento específico de la pérdida de peso asociada con enfermedades crónicas es de vital importancia.

CAPROMORELINA

Agonista selectivo de los receptores de la grelina

- ✓ La grelina, la “hormona del hambre”, es una hormona natural que tiene diversos efectos, entre ellos la estimulación del apetito y el aumento de la masa muscular en diferentes especies⁶.
- ✓ La capromorelina, un agonista de los receptores de la grelina, imita sus efectos.

Modo de acción combinado



Más de 8/10 gatos con ERC tratados con Eluracat mantuvieron o aumentaron de peso (estudio de 56 días)⁷.



- Solución oral
- Formulado específicamente para gatos



- Dosis: 2 mg/kg, una vez al día
- Volumen de dosificación bajo (0,1 ml/Kg)
- Jeringa dosificadora incluida para mayor comodidad



- **Adecuado para uso a largo plazo:** es probable que se necesite una administración a largo plazo ya que las afecciones médicas crónicas tienden a ser progresivas y se espera que la pérdida de peso continúe si no se trata
- **Bien tolerado:** La reacción adversa más común observada en los estudios fue la hipersalivación, generalmente leve, transitoria y que se resuelve en cuestión de minutos.



1. Data on file. REF-23006. • 2. Freeman, L.M. Cachexia and Sarcopenia: Emerging Syndromes of Importance in Dogs and Cats, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2012;26:3-17. • 3. Peterson M et al. Evaluation of Body Weight, Body Condition, and Muscle Condition in Cats with Hyperthyroidism. Journal of Veterinary Internal Medicine 2016;30:1780-1789. • 4. Freeman et al. Evaluation of Weight Loss Over Time in Cats with Chronic Kidney Disease, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2016;30:1661-1666. • 5. Perez-Camargo, G. The aging feline: advances in nutrition and care for the older cat-cat nutrition: what is new in the old? Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, 2004, 26(2): 5-10. • 6. Rhodes, L., Zollers, B., Wofford, J. A., & Heinen, E. Capromorelin: A ghrelin receptor agonist and novel therapy for stimulation of appetite in dogs. Veterinary Medicine and Science, 2018, 4(1), 3-16. • 7. Wofford JA et al. Capromorelin promotes weight gain in cats with unintended weight loss: a randomized, masked, placebo-controlled clinical trial. Journal of Feline Medicine and Surgery 2025 1-9. • 8. Freeman L, Becvarova I, Cave N, et al. WSAVA Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011;13(7):516-525. • 9. Freeman, L.M. Cachexia and Sarcopenia: Emerging Syndromes of Importance in Dogs and Cats, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2012, pp. 3-17. • 10. J.L. Baez et al. A prospective investigation of the prevalence and prognostic significance of weight loss and changes in body condition in feline cancer patients. Journal of Feline Medicine and Surgery (2007) 9, 411e417.

