


# Analgesia

## en el quirófano



ALIVIRA

# Toda cirugía causa dolor

dolor



## Impacta en el bienestar

Genera estrés y alteraciones en todo el organismo



Debe considerarse la sensibilidad individual de cada animal




## Si no se trata puede causar:

- Hipersensibilidad
- Desarrollo de memoria
- Dolor crónico


¡Asegúrate  
de proporcionar  
una analgesia  
adecuada

**ANTES, DURANTE  
y DESPUÉS**

de la cirugía!




# Intervenciones con dolor leve




| Tipo y zona quirúrgica    | Duración del dolor |
|---------------------------|--------------------|
| pequeños tumores cutáneos | 0,5 – 3 días       |
| grandes tumores cutáneos  | 1 – 3 días         |
| orquiectomía              | 1 – 2 días         |

# Intervenciones con dolor moderado




| Tipo y zona quirúrgica | Duración del dolor |
|------------------------|--------------------|
| perineales             | 1 – 3 días         |
| abdomen caudal         | 1 – 3 días         |
| ovariohisterectomía    | 1 – 3 días         |
| abdomen craneal        | 4 – 6 días         |
| gastrotomía            | 4 – 6 días         |
| artrotomía             | 3 – 8 días         |
| osteosíntesis          | 4 – 10 días        |

# Intervenciones con dolor severo



| Tipo y zona quirúrgica       | Duración del dolor |
|------------------------------|--------------------|
| cabeza<br>(ojo, oído, nariz) | 2 – 5 días         |
| columna toracolumbar         | 3 – 4 días         |
| columna cervical             | 3 – 6 días         |
| toracotomía intercostal      | 6 días             |
| toracotomía esternal         | 10 días            |



ALIVIRA

[www.alivira.es](http://www.alivira.es)



**Referencias:**

Monteiro BP et al. 2022 WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain.  
Eberspächer-Schweda E. AnaesthesiaSkills in veterinary medicine. 2023.